

的无钠饮食或引起血压的骤和 / 或血浆肌性发作，但是量。

量应根据血压避免突然发生

性心脏病或脑

对于等待纠正

压剂量开始治疗过程中会

病(存在血钾小剂量开始。受体阻滞剂的联合治疗。

剂向)，治疗应药物或胰岛素第一个月应密

降低血压效果率在两种高血

药时，血管紧张素转换酶药。

剂。

性黄疸有关，发生机制尚不清楚或明显的医疗随访。

序的一些患者肾功能不全，脱水、急性心体舒适、依普以及其他可引眩 / 碘胺甲恶剂、3g/ 天体抗炎药以及者，使用保钾的患者而言，有时是致命真使用并定期

的钠离子水平和老年人和肝]和[药物过生非常严重的血压，合并美]的发生率低，

量嗜性利尿剂无论是正在心病患者和心全(小于 3.4

症的毒性并增性的，使用本药尤其有致命

治疗的第一个

非出而引起轻3甲状腺腺功止治疗。

重要的。

率为 70 毫升 / 分钟。

药物动力学有所改变：母体分子的肝生成量并不减少，因此无需调整剂量。

吸收。
可达到血浆峰值水平。

(平均值为 18 小时)。重复给药不引
物主要通过尿 (剂量的 70%) 和粪便

动力学无改变。

剂型 固体药用硬片 / 药用铝箔)。7 片 / 板

191

限公司
发区东区顺江大道南段 53 号

限公司
发区东区顺江大道南段 53 号

